FRANCÉS

Apellidos _____ **Nombre**_____

DNI _____ **Fecha** _____

1. COMPRÉHENSION DE L' ÉCRIT (Total: 3 points)

VOILÀ LA NOTICE FOURNIE DANS LA BOÎTE DE CE MÉDICAMENT. LISEZ-LA, PUIS EXÉCUTEZ LA CONSIGNE.

Aspégic 1000

Ne pas administrer à l'enfant

COMPOSITION
Acétylsalicylate de lysine : 1800 correspondant à 1000 mg. d'acide acétylsalicylique (aspirine) pour un sachet.

PRÉSENTATION
Boîte de 20 sachets

INDICATIONS
- États fébriles
- Douleurs d'origines diverses
- Affections rhumatismales
- ASPÉGIC 1000 ne contient pas de sodium et peut donc être utilisé même en cas de régime sans sel strict.

CONTRE-INDICATIONS
- Allergie à l'aspirine
- Ulcère gastroduodénal
- Maladies hémorragiques
- Risques hémorragiques

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
En raison de la teneur en principe actif, ne jamais administrer ASPEGIC 1000 à l'enfant
Ne pas utiliser en cas d'antécédents d'ulcère gastrique ou d'hémorragie digestive; de traitement anticoagulant associé; d'asthme; d'insuffisance rénale.
À déconseiller en cas : de grossesse, de règles importantes; de goutte.
Ne pas laisser à portée des enfants.
Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.
Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter rapidement le médecin en cas de surdosage ou de troubles inhabituels.

INTÉRACTION MÉDICAMENTEUSES
Prendre conseil auprès de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'associer à ASPEGIC 1000 des médicaments tels que: anticoagulants; anti-inflammatoires non stéroïdiens; sulfamides hypoglycémiants; uricosuriques; méthotrexate.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI
Habituellement un sachet d'ASPEGIC 1000 trois fois par jour (un sachet matin, midi et soir)
Dans le cas de traitements intensifs, sur avis médical, des posologies de 4 à 6 sachets par jour peuvent être atteintes.
ASPEGIC 1000 est destiné à être absorbé par la bouche après dissolution dans un liquide.
Verser la poudre dans un verre, faire dissoudre dans un peu d'eau, de lait ou de jus de fruit.
Agiter quelques secondes.

CONSIGNE :

Ce médicament, est-il contre-indiqué à ces personnes? Cochez la réponse: oui /non

	OUI	NON
Ludovic: Mon médecin m'a interdit les aliments salés.		
Hélène : j'ai dix ans et demi.		
Monique: Je suis enceinte		
Pierre: je préfère les solutions buvables.		
Marie: je saigne souvent à cause de mes troubles gastriques.		
Jean-Luc: A part des céphalées, j'ai une santé de fer.		

2. COMPRÉHENSION ORALE. (Total 3 points)

Lisez les phrases suivantes, écoutez ensuite l'enregistrement, puis répondez.

Une deuxième écoute vous permettra de vérifier vos réponses.

LA TUBERCULOSE AU XIXe SIÈCLE : IMAGE ET RÉALITÉ

1.- Au XVIIIe et XIXe siècle il était rare que, dans une famille, ...

..... (0.50)

2.- Pendant le VIIIe siècle la tuberculose a eu une image .....

..... (0.50)

3.- Dans les années 1830 on a remarqué que la maladie était plus fréquente .....

..... (0.50)

4.-Au XIXe siècle la tuberculose s'est répandue à Londres .....

..... (0.50)

5-Pour lutter contre la tuberculose il était primordial .....

..... (0.50)

6.-Des affiches d'information ont été accrochées .....

..... (0.50)

3. PRODUCTION ÉCRITE (100 MOTS) (Total 4 points)

- Plus de sept français sur dix avouent recourir à l'automédication. Avez-vous recours à cette pratique? Si oui, dans quels cas? Donnez votre avis sur les risques que cela peut entraîner.

- Pour le maintien de la santé, êtes-vous pour les méthodes naturelles ou pour la médecine conventionnelle? Pourquoi?

- Vous êtes en bonne santé et vous souhaitez le rester. Que faites-vous dans la vie courante de chaque jour dans ce but?